Centre d'Infectiologie
Charles Mérieux

LISTE DES ANALYSES DU LRM Madagascar

laboratoire RODOLPHE MÉRIEUX MADAGASCAR

TYPE D'ANALYSE	Premier emballage	Volume minimum prélevé	Délai maximum et température de conservation/transport avant arrivée au laboratoire		Condition particulière	Délai de rendu du résultat	Délai d'ajout d'analyse sur échantillon
Analyse bactériologique et mycobactériologique							
Examen bactériologique des prélèvements animaux, alimentaires, environnementaux	Boite de petri, sachet zip lock, Milieu de transport spécialisé	1ml	48h	entre +2 à +8°C	Isoler les individus	5 jours	1 semaine
Examen bactériologique des prélèvements d'eau	Flc stérile 1L	1L	Acheminer immédiatement	entre +2 à +8°C		15 jours	1 semaine
Examen bactériologique des prélèvements humains (Urines, selles, pus)	pot stérile, milieu de transport sp	1ml	2h	entre +2 à +8°C	Faire parvenir le matin	48h	1 semaine
Examen microscopique des biopsies cutanées (lèpre)	pot stérile	40mg	1 semaine	entre +2 à +8°C		1 mois	15 jours
Analyse mycologique							
Examen mycologique des prélèvements cutanés et biopsie	cryotube	40mg		entre +2 à +8°C	Sous triple emballage	1mois pour la culture	1 semaine
Biologie moléculaire							
RT PCR Covid 19	milieu de transport spécifique	1ml	2h	entre +2 à +8°C		48h	Pas de possibilité d'ajout
RT PCR ARN VIH	tube EDTA	2ml	24h	entre +2 à +8°C	Prélèvement non hémolysé	1semaine	1 mois
RT PCR ADN VIH	tube EDTA	2ml	24h	entre +2 à +8°C	Prélèvement non hémolysé	1semaine	1 mois
RT PCR VHB	tube EDTA	2ml	24h	entre +2 à +8°C	Prélèvement non hémolysé	1semaine	1 mois
RT PCR Rlep	cryotube	40mg	24h	entre +2 à +8°C		1mois	1 mois
PCR classique HAIN	cryotube	40mg	24h	entre +2 à +8°C		1mois	1 mois
PCR classique pour diagnostic mycologique	biopsie dans pot stéril	40mg		entre +2 à +8°C	Sous triple emballage	1mois	Selon la disponibilité de l'échantillon
GeneXpert ADN VIH	tube EDTA	1ml	24h	entre +2 à +8°C	Non hémolysé	1semaine	1 mois
GeneXpert ARN VIH	tube EDTA	5ml	24h	entre +2 à +8°C	Non hémolysé	1 jour	1 mois
GeneXpert ADN VHB	tube EDTA	1ml	à tout heure	entre +2 à +8°C	Sous triple emballage	1 jour	1 mois
Biofire panel respiratoire	milieu de transport spécialisé		24h	entre +2 à +8°C	Sous triple emballage	48h	Pas de possibilité d'ajout
Biofire panel méningite	cryotube	2ml	Acheminer immédiatement	entre +2 à +8°C	Sous triple emballage	2h	Pas de possibilité d'ajout
Séquençage Bactériologie	cryotube	40mg	1 semaine	entre +2 à +8°C		1mois	Pas de possibilité d'ajout
Séquençage VIH	cryotube	40mg	1 semaine	entre +2 à +8°C		1mois	Pas de possibilité d'ajout
Séquençage gènome entier du *Mycobacterium leprea*	cryotube	40mg	1 semaine	entre +2 à +8°C		1mois	Pas de possibilité d'ajout
Sérologie							
Sérologie de la Lèpre	tube sec	2 ml	6h	entre +2 à +8°C		24h	1 mois
Sérologie VHC	tube sec ou EDTA	5 ml	Acheminer immédiatement			24h	1 mois
Sérologie VHB	tube sec ou EDTA	5 ml	Acheminer immédiatement			24h	1 mois

Centre d'Infectiologie Charles Mérieux (CICM). Antananarivo-MADAGASCAR. Université Antananarivo -Madagascar.
BP 4299 -Tél +261 34 16 410 17. contact@cicm-madagascar.org/ www.cicm-madagascar.com